

CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR



(41) 3666-8426  
AOPAAGROECOLOGIA@GMAIL.COM  
WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG



# | SUMÁRIO

Abobrinha Italiana .....	03
Abobrinha Caserta .....	04
Abóbora Menina Brasileira .....	06
Abóbora Menina Gigante .....	07
Abóbora canhão .....	08
Alface Repolhuda Roxa .....	10
Alface Roxa .....	11
Alface Crespa Mimosa .....	12
Alface Crioula .....	13
Cenoura Caipira .....	15
Cenoura Crioula .....	16
Cebola .....	18
Couve Manteiga .....	20
Couve Georgia .....	21
Couve-Chinesa .....	22
Ervilha Vagem Crioula .....	23
Ervilha de Grão .....	25
F. Vagem Macarrão Trep. (branco) .....	26
Feijão Olho de Pombo .....	28
Feijão Guandú .....	29
Moranga Exposição .....	31
Melancia Vermelha.....	33
Melancia Amarela.....	34
Milho Pipoca .....	36
Milho Doce .....	37
Melão .....	39
Pepino Caipira .....	41
Quiabo .....	43
Repolho Louco de Verão.....	45
Rúcula .....	47
Salsa .....	49
Tomate Tipo Salada.....	51

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

ABOBRINHA ITALIANA	<i>Cucurbita pepo L.</i>
ABOBRINHA CASERTA	<i>Cucurbita pepo L.</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# Cucurbita pepo

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## ABOBRINHA ITALIANA



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se melhor sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Temperaturas elevadas podem prejudicar a polinização. Não tolera geadas.

**Descrição** – Seus frutos são de fácil digestão, ricos em niacina, e fonte de vitaminas do complexo B. As abobrinhas são produzidas de forma semelhante à abóbora, mas são colhidas ainda imaturas (verdes). Podem ser semeadas diretamente no local de plantio ou em bandejas para transplante. Mas cuidado: são sensíveis ao transplante, já que suas raízes não se recuperam depois de danificadas. A cultura é sensível ao excesso de água no solo. O início da colheita dependerá da cultivar escolhida e do ponto de maturação exigido pelo consumidor.

**Nome popular:** Abobrinha italiana, abobrinha verde, abobrinha.

**Nome científico:** *Cucurbita pepo* L.

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ABOBRINHA ITALIANA	SET./MAIO	AGO./MAIO	MAR./OUT.	ANO TODO	ABR./AGO.	45/60 DIAS

## ABOBRINHA CASERTA



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se melhor sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Temperaturas elevadas podem prejudicar a polinização. Não tolera geadas.

**Descrição** – Seus frutos são de fácil digestão, ricos em niacina, e fonte de vitaminas do complexo B. As abobrinhas são produzidas de forma semelhante à abóbora, mas são colhidas ainda imaturas (verdes). Podem ser semeadas diretamente no local de plantio ou em bandejas para transplante. Mas cuidado: são sensíveis ao transplante, já que suas raízes não se recuperam depois de danificadas. A cultura é sensível ao excesso de água no solo. O início da colheita dependerá da cultivar escolhida e do ponto de maturação exigido pelo consumidor.

**Nome popular:** Abobrinha Caserta, Abobrinha de tronco

**Nome científico:** *Cucurbita pepo* L.

### ESPÉCIE

### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO



### INÍCIO DA COLHEITA

	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ABOBRINHA CASERTA	SET./MAIO	AGO./MAIO	MAR./OUT.	ANO TODO	ABR./AGO.	<b>45/60 DIAS</b>

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

ABÓBORA MENINA BRASILEIRA	<i>Cucurbita moschata</i>
ABÓBORA MENINA GIGANTE	<i>Cucurbita maxima</i>
ABÓBORA CANHÃO	<i>Cucurbita moschata</i>
ABÓBORA VARIEDADE SEM TERRA	<i>Cucurbita moschata</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# Cucurbita

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## Cucurbita moschata

### ABÓBORA MENINA BRASILEIRA



**Época e regiões para plantio** – É favorecida por temperaturas elevadas. Tolerante a temperaturas amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias curtos, com menor exposição do Sol, favorecem a floração feminina, resultando em maior produtividade. Em regiões de inverno suave, é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

**Descrição** – É uma cultura tipicamente tropical com frutos ricos em vitamina A. Também fornece vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma planta encontram-se flores femininas (que originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). Para boa produtividade e frutos sem deformações, é necessária a presença de abelhas para a polinização. Os tipos mais encontrados são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou seja aplicado hormônio sintético nas flores.

**Nome popular:** Abóbora menina brasileira

**Nome científico:** *Cucurbita moschata*

#### ESPÉCIE

#### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO

#### INÍCIO DA COLHEITA

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ABÓBORA MENINA BRASILEIRA	OUT./FEV.	SET./MAR.	MAR./OUT.	ANO TODO	ABR./AGO.	90/120 DIAS

### Cucurbita moxima

## ABÓBORA MENINA GIGANTE



**Época e regiões para plantio** – É favorecida por temperaturas elevadas. Tolerante a temperaturas amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias curtos, com menor exposição do Sol, favorecem a floração feminina, resultando em maior produtividade. Em regiões de inverno suave, é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

**Descrição** – É uma cultura tipicamente tropical com frutos ricos em vitamina A. Também fornece vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma planta encontram-se flores femininas (que originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). Para boa produtividade e frutos sem deformações, é necessária a presença de abelhas para a polinização. Os tipos mais encontrados são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou seja aplicado hormônio sintético nas flores.

**Nome popular:** Abóbora menina gigante

**Nome científico:** *Cucurbita maxima*

### ESPÉCIE

### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO

### INÍCIO DA COLHEITA

	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ABÓBORA MENINA GIGANTE	OUT./FEV.	SET./MAR.	MAR./OUT.	ANO TODO	ABR./AGO.	90/120 DIAS

## Cucurbita moschata

### ABÓBORA CANHÃO



**Época e regiões para plantio** – É favorecida por temperaturas elevadas. Tolerante a temperaturas amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias curtos, com menor exposição do Sol, favorecem a floração feminina, resultando em maior produtividade. Em regiões de inverno suave, é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

**Descrição** – É uma cultura tipicamente tropical com frutos ricos em vitamina A. Também fornece vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma planta encontram-se flores femininas (que originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). Para boa produtividade e frutos sem deformações, é necessária a presença de abelhas para a polinização. Os tipos mais encontrados são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou seja aplicado hormônio sintético nas flores.

**Nome popular:** Abóbora canhão

**Nome científico:** *Cucurbita moschata*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ABÓBORA CANHÃO	OUT./FEV.	SET./MAR.	MAR./OUT.	ANO TODO	ABR./AGO.	90/120 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE	
ALFACE REPOLHADA ROXA	<i>Lactuca sativa var. crispa</i>
ALFACE ROXA	<i>Lactuca sativa var. crispa</i>
ALFACE CRESPA MIMOSA	<i>Lactuca sativa var. crispa</i>
ALFACE CRESPA	<i>Lactuca sativa var. crispa</i>
ALFACE PEQUENA	<i>Lactuca sativa</i>
ALFACE CRIOLA BIO RAINHA	<i>Lactuca sativa</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# Lactuca sativa

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## ALFACE REPOLHADA ROXA



**Época e regiões para plantio** – Pode ser cultivada durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e outras para plantio em regiões de clima ameno.

**Descrição** – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As folhas podem ser lisas ou crespas, com ou sem formação de cabeça. Também existem alfaces com folhas roxas ou folhas bem recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do pendoamento (emissão do pendão floral), momento em que as folhas começam a apresentar um sabor amargo característico. O plantio em local definitivo é feito por mudas semeadas em bandejas ou copinhos.

**Nome popular:** Alface repolhuda roxa

**Nome científico:** *Lactuca sativa* L.

### ESPÉCIE

### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO

### INÍCIO DA COLHEITA

	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ALFACE REPOLHADA ROXA	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	50/70 DIAS

### ALFACE ROXA



**Época e regiões para plantio** – Pode ser cultivada durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e outras para plantio em regiões de clima ameno.

**Descrição** – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As folhas podem ser lisas ou crespas, com ou sem formação de cabeça. Também existem alfaces com folhas roxas ou folhas bem recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do pendoamento (emissão do pendão floral), momento em que as folhas começam a apresentar um sabor amargo característico. O plantio em local definitivo é feito por mudas semeadas em bandejas ou copinhos.

**Nome popular:** Alface roxa

**Nome científico:** *Lactuca sativa* var. *crispa*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ALFACE ROXA	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	50/70 DIAS

### ALFACE CRESPA MIMOSA



**Época e regiões para plantio** – Pode ser cultivada durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e outras para plantio em regiões de clima ameno.

**Descrição** – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As folhas podem ser lisas ou crespas, com ou sem formação de cabeça. Também existem alfaces com folhas roxas ou folhas bem recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do pendoamento (emissão do pendão floral), momento em que as folhas começam a apresentar um sabor amargo característico. O plantio em local definitivo é feito por mudas semeadas em bandejas ou copinhos.

**Nome popular:** Alface crespa mimosa

**Nome científico:** *Lactuca sativa var. crispata*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ALFACE CRESPA MIMOSA	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	50/70 DIAS

### ALFACE CRIOULA



**Época e regiões para plantio** – Pode ser cultivada durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e outras para plantio em regiões de clima ameno.

**Descrição** – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As folhas podem ser lisas ou crespas, com ou sem formação de cabeça. Também existem alfaces com folhas roxas ou folhas bem recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do pendoamento (emissão do pendão floral), momento em que as folhas começam a apresentar um sabor amargo característico. O plantio em local definitivo é feito por mudas semeadas em bandejas ou copinhos.

**Nome popular:** Alface crioula

**Nome científico:** *Lactuca sativa* L.

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ALFACE CRIOULA	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	50/70 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

CENOURA CAIPIRA	<i>Daucus carota</i>
CENOURA BRASÍLIA BN	<i>Daucus carota</i>
CENOURA CRIOLA DA LAPA	<i>Daucus carota</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Daucus carota*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



### CENOURA CAIPIRA



**Época e regiões para plantio** – A faixa ideal para uma germinação rápida e uniforme das sementes é de 20° a 30°C. Para cultivares de verão, baixas temperaturas no campo induzem as plantas a florescerem, o que só é desejável para produtores de sementes. Deve-se atentar à adequação da cultivar com o clima na época de plantio.

**Descrição** – A cenoura é uma planta cuja parte comestível é a raiz tuberosa de cor alaranjada. Tem alto teor de betacaroteno, substância necessária à produção de vitamina A pelo nosso organismo. Também fornece cálcio, sódio e potássio. O solo deve ser bem fofo, sem qualquer obstáculo ao crescimento das raízes, para que não ocorram deformações. O amarelecimento e o secamento das folhas mais velhas e o arqueamento das folhas mais novas são indicativos do ponto de colheita.

**Nome popular:** Cenoura caipira

**Nome científico:** *Daucus carota L.*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
CENOURA CAIPIRA	NOV./JAN.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	85/100 DIAS

## CENOURA CRIOLA



**Época e regiões para plantio** – A faixa ideal para uma germinação rápida e uniforme das sementes é de 20° a 30°C. Para cultivares de verão, baixas temperaturas no campo induzem as plantas a florescerem, o que só é desejável para produtores de sementes. Deve-se atentar à adequação da cultivar com o clima na época de plantio.

**Descrição** – A cenoura é uma planta cuja parte comestível é a raiz tuberosa de cor alaranjada. Tem alto teor de betacaroteno, substância necessária à produção de vitamina A pelo nosso organismo. Também fornece cálcio, sódio e potássio. O solo deve ser bem fofo, sem qualquer obstáculo ao crescimento das raízes, para que não ocorram deformações. O amarelecimento e o secamento das folhas mais velhas e o arqueamento das folhas mais novas são indicativos do ponto de colheita.

**Nome popular:** Cenoura crioula

**Nome científico:** *Daucus carota L.*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
CENOURA CRIOLA	NOV./JAN.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	OUT./MAR.	85/100 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

CEBOLA	<i>Allium cepa</i> L.
--------	-----------------------

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Allium cepa*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulas

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Allium cepa

### CEBOLA



**Época e regiões para plantio** – De modo geral, não forma bulbos em dias com duração inferior a 10 horas de luz. Os bulbos crescem e amadurecem mais rapidamente sob temperaturas altas. Mas a alta temperatura não tem efeito, se as horas de luz diárias exigidas não forem suficientes. Plantas expostas a um período prolongado de frio são induzidas a florescer, o que é desejável somente a produtores de sementes.

**Descrição** – É planta originária da Ásia, sendo que a parte utilizável é um bulbo originado de folhas carnosas. É rica em vitaminas do complexo B, principalmente B1 e B2, e vitamina C. Pode ser semeada em local definitivo e em bandejas ou sementeiras para posterior transplante das mudas. O plantio também pode ser feito por bulbinhos, colhidos com 1 a 3 centímetros de diâmetro. Existe no mercado cultivares adaptadas a períodos de dias mais curtos e mais longos, de ciclo curto, mediano e longo.

**Nome popular:** Cebola

**Nome científico:** *Allium cepa* L.

### ESPÉCIE

### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO

### INÍCIO DA COLHEITA

	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte
CEBOLA	JUL./AGO.	FEV./MAIO	FEV./ABR.	FEV./MAIO	FEV./MAIO

120/180 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

COUVE MANTEIGA	<i>Brassica oleracea L.</i>
COUVE CONTESTADO	<i>Brassica oleracea L.</i>
COUVE GEORGIA	<i>Brassica oleracea L.</i>
COUVE CHINESA	<i>Brassica oleracea L.</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# Brassica oleracea

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



### COUVE MANTEIGA



**Época e regiões para plantio** – A couve é uma cultura típica dos períodos de outono e inverno, apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser plantada durante o ano todo, mas as épocas mais indicadas por região estão descritas abaixo.

**Descrição** – Apresenta caule ereto e emite novas folhas continuamente ao redor do caule. É muito rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas A, C, K e B5. Propaga-se por semente ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de propagação mais comum. A cultura é bastante exigente em boro e molibdênio. de ciclo curto, mediano e longo.

**Nome popular:** Couve manteiga

**Nome científico:** *Brassica oleracea L.*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
COUVE MANTEIGA	FEV./JUL.	FEV./JUL.	ABR./AGO.	FEV./JUL.	ABR./JUL.	80/90 DIAS

## COUVE GEORGIA



**Época e regiões para plantio** – A couve é uma cultura típica dos períodos de outono e inverno, apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser plantada durante o ano todo, mas as épocas mais indicadas por região estão descritas abaixo.

**Descrição** – Apresenta caule ereto e emite novas folhas continuamente ao redor do caule. É muito rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas A, C, K e B5. Propaga-se por semente ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de propagação mais comum. A cultura é bastante exigente em boro e molibdênio. de ciclo curto, mediano e longo.

**Nome popular:** Couve georgia

**Nome científico:** *Brassica oleracea L.*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
COUVE GEORGIA	FEV./JUL.	FEV./JUL.	ABR./AGO.	FEV./JUL.	ABR./JUL.	80/90 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Brassica oleracea

### COUVE CHINESA



**Época e regiões para plantio** – A couve é uma cultura típica dos períodos de outono e inverno, apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser plantada durante o ano todo, mas as épocas mais indicadas por região estão descritas abaixo.

**Descrição** – Apresenta caule ereto e emite novas folhas continuamente ao redor do caule. É muito rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas A, C, K e B5. Propaga-se por semente ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de propagação mais comum. A cultura é bastante exigente em boro e molibdênio. de ciclo curto, mediano e longo.

**Nome popular:** Couve-chinesa ou repolho chinês, chamada erroneamente de acelga.

**Nome científico:** *Brassica pekinensis* (Lou.).

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
COUVE CHINESA	ANO TODO	ANO TODO	MAR./MAIO	MAR./MAIO	*	60/70 DIAS

\* Não recomendável

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG



## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

ERVILHA VAGEM CRIOLA	<i>Pisum sativum L.</i>
ERVILHA DE GRÃO	<i>Pisum sativum L.</i>
F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO)	<i>Phaseolus vulgares</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

*Pisum sativum*  
+  
*Phaseolus vulgares*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulas

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Pisum sativum

### ERVILHA VAGEM CRIOULA



**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas amenas a frias (de 25°C para baixo), adaptandose às condições dos períodos de outono e inverno das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem ocorrer chuvas no início da colheita.

**Descrição** – A ervilha é uma planta semelhante a feijão-vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria (cultivares para debulhar, que geram grãos secos e verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e fibras. A semeadura é feita diretamente no local definitivo, pois não tolera o transplante. Para a produção de vagens comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 dias após o plantio, com os grãos ainda em desenvolvimento, dependendo da cultivar.

**Nome popular:** Ervilha vagem crioula

**Nome científico:** *Pisum sativum* L.

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ERVILHA VAGEM CRIOULA	ABR./MAIO	ABR./MAIO	*	ABR./MAIO	*	60/70 DIAS

\* Não recomendável

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG




## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Erioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Pisum sativum

### ERVILHA DE GRÃO



**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas amenas a frias (de 25°C para baixo), adaptandose às condições dos períodos de outono e inverno das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem ocorrer chuvas no início da colheita.

**Descrição** – A ervilha é uma planta semelhante a feijão-vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria (cultivares para debulhar, que geram grãos secos e verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e fibras. A semeadura é feita diretamente no local definitivo, pois não tolera o transplante. Para a produção de vagens comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 dias após o plantio, com os grãos ainda em desenvolvimento, dependendo da cultivar.

**Nome popular:** Ervilha de grão

**Nome científico:** *Pisum sativum* L.

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
ERVILHA DE GRÃO	ABR./MAIO	ABR./MAIO	*	ABR./MAIO	*	60/70 DIAS

\* Não recomendável

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Phaseolus vulgares

### F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO)



**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas amenas a frias (de 25°C para baixo), adaptandose às condições dos períodos de outono e inverno das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem ocorrer chuvas no início da colheita.

**Descrição** – A ervilha é uma planta semelhante a feijão-vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria (cultivares para debulhar, que geram grãos secos e verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e fibras. A semeadura é feita diretamente no local definitivo, pois não tolera o transplante. Para a produção de vagens comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 dias após o plantio, com os grãos ainda em desenvolvimento, dependendo da cultivar.

**Nome popular:** F. vagem macarrão trep. (branco)

**Nome científico:** Phaseolus vulgares

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO)	ABR./MAIO	ABR./MAIO	*	ABR./MAIO	*	<b>60/70 DIAS</b>

\* Não recomendável

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE	
FEIJÃO OLHO DE POMBO	<i>Vigna unguiculata</i>
FEIJÃO CATADOR UN. ESCURO	<i>Vigna unguiculata</i>
FEIJÃO CATADOR UNICOLOR	<i>Vigna unguiculata</i>
FEIJÃO CATADOR UM. CLARO	<i>Vigna unguiculata</i>
FEIJÃO CATADOR RAJADO	<i>Vigna unguiculata</i>
FEIJÃO GUANDÚ	<i>Cajanus cajan</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Vigna unguiculata*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



### FEIJÃO OLHO DE POMBO



**Época e regiões para plantio** – Não tolera baixas temperaturas e geadas, desenvolvendo-se melhor sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) a altas. Em regiões com inverno ameno, é possível o plantio durante o ano todo.

**Descrição** – O feijão é rico em proteína, importante para a formação dos músculos. Possui cultivares de três tipos: grupo macarrão (vagem cilíndricas), grupo manteiga (vagens achatadas) e as do grupo rasteiro (vagem cilíndrica e planta de crescimento determinado). Deve ser semeado diretamente no local definitivo de plantio. Temperaturas extremas (calor ou frio excessivo) podem provocar queda de flores ou vagens deformadas pela deficiência na polinização. O ponto de colheita ideal é quando as vagens atingem o máximo de desenvolvimento, antes de se tornarem fibrosas.

**Nome popular:** Feijão olho de pombo

**Nome científico:** *Vigna unguiculata*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
FEIJÃO OLHO DE POMBO	SET./MAR.	AGO./MAR.	ANO TODO	MAR./AGO.	ABR./JUL.	60/70 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulas

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Vigna unguiculata

### FEIJÃO GUANDÚ



**Época e regiões para plantio** – Não tolera baixas temperaturas e geadas, desenvolvendo-se melhor sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) a altas. Em regiões com inverno ameno, é possível o plantio durante o ano todo.

**Descrição** – O feijão é rico em proteína, importante para a formação dos músculos. Possui cultivares de três tipos: grupo macarrão (vagem cilíndricas), grupo manteiga (vagens achatadas) e as do grupo rasteiro (vagem cilíndrica e planta de crescimento determinado). Deve ser semeado diretamente no local definitivo de plantio. Temperaturas extremas (calor ou frio excessivo) podem provocar queda de flores ou vagens deformadas pela deficiência na polinização. O ponto de colheita ideal é quando as vagens atingem o máximo de desenvolvimento, antes de se tornarem fibrosas.

**Nome popular:** Feijão guandú

**Nome científico:** *Cajanus cajan*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
FEIJÃO GUANDÚ	SET./MAR.	AGO./MAR.	ANO TODO	MAR./AGO.	ABR./JUL.	60/70 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

MORANGA EXPOSIÇÃO	<i>Cucurbita maxima Duch.</i>
MORANGA GOMO COM BICO	<i>Cucurbita maxima Duch.</i>
MORANGA GUARANI	<i>Cucurbita maxima Duch.</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Cucurbita máxima*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## MORANGA EXPOSIÇÃO



**Época e regiões para plantio** – São mais tolerantes que as abóboras em relação a temperaturas mais baixas e menos tolerante ao excesso de chuvas. É uma planta de clima quente, mas tolera temperaturas amenas (entre 15° a 25°C). São geralmente plantadas durante a primavera-verão.

**Descrição** – Os frutos da moranga são ricos em vitamina A e carboidratos. É uma cultura que se adapta a vários tipos de solo, sendo a condução da lavoura semelhante à de abóbora. Assim como as abóboras, pode ser plantada em local definitivo (2 a 3 sementes por cova), ou por transplante de mudas semeadas em bandejas ou copinhos. Deve-se tomar o cuidado para não danificar as raízes no momento do transplante. Os frutos possuem polpa e casca alaranjadas e seus gomos são destacados.

**Nome popular:** Moranga exposição

**Nome científico:** *Cucurbita maxima* Duch.

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MORANGA EXPOSIÇÃO	SET./DEZ.	SET./DEZ.	MAR./JUN.	SET./DEZ.	*	120/150 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

MELANCIA REDONDA VERMELHA	<i>Citrullus lanatus</i>
MELANCIA REDONDA AMARELA	<i>Citrullus lanatus</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426


# *Citrullus lanatus*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## MELANCIA VERMELHA



**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas elevadas e não tolera frio nem geadas. Em regiões de baixa altitude e com irrigação como as observadas no Centro-Oeste, a melancia também pode ser plantada nos períodos de outono e inverno, utilizando-se irrigação para formar frutos de alta qualidade.


**Descrição** – É rica em vitamina A e vitamina C. Possui flores femininas (que originarão o fruto) e masculinas (que fornecem o pólen) na mesma planta. É essencial a presença de abelhas para que o fruto fique bem formado. Dias quentes e secos originam frutos mais doces. Há cultivares de formato alongado, globular (a mais comum), sem sementes e de tamanho mini. A melancia deve ser colhida quando a casca em contato com o solo mudar da cor verde esbranquiçado para amarelo.

**Nome popular:** Melancia vermelha

**Nome científico:** *Citrullus lanatus*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MELANCIA VERMELHA	SET./JAN.	AGO./MAR.	MAR./SET.	SET./DEZ.	ABR./AGO.	85/90 DIAS

## MELANCIA AMARELA



**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas elevadas e não tolera frio nem geadas. Em regiões de baixa altitude e com irrigação como as observadas no Centro-Oeste, a melancia também pode ser plantada nos períodos de outono e inverno, utilizando-se irrigação para formar frutos de alta qualidade.

**Descrição** – É rica em vitamina A e vitamina C. Possui flores femininas (que originarão o fruto) e masculinas (que fornecem o pólen) na mesma planta. É essencial a presença de abelhas para que o fruto fique bem formado. Dias quentes e secos originam frutos mais doces. Há cultivares de formato alongado, globular (a mais comum), sem sementes e de tamanho mini. A melancia deve ser colhida quando a casca em contato com o solo mudar da cor verde esbranquiçado para amarelo.

**Nome popular:** Melancia amarela

**Nome científico:** *Citrullus lanatus*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MELANCIA AMARELA	SET./JAN.	AGO./MAR.	MAR./SET.	SET./DEZ.	ABR./AGO.	85/90 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

MILHO PIPOCA	<i>Zea mays</i>
MILHO SUPER DOCE	<i>Zea mays</i>
MILHO 8 CARREIRA	<i>Zea mays</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Zea mays*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



# CARTILHA DE SEMENTES 2022

## Sementes Crioulas

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### Zea mays

## MILHO PIPOCA



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se bem em regiões de clima quente e ameno, sendo prejudicada pelo frio e geada. Onde não há inverno rigoroso, pode ser plantado o ano todo.

**Descrição** – Produz em vários tipos de solo, porém é exigente em adubação com zinco e magnésio, devendo ser bem adubado. Essa cultura é uma ótima opção para rotação de culturas com as demais hortaliças.

**Nome popular:** Milho pipoca

**Nome científico:** Zea mays

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MILHO PIPOCA	AGO./FEV.	SET./DEZ.	OUT./MAR.	SET./JAN.	MAR./MAIO	80/110 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulas

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## Zea mays

### MILHO DOCE



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se bem em regiões de clima quente e ameno, sendo prejudicada pelo frio e geada. Onde não há inverno rigoroso, pode ser plantado o ano todo.

**Descrição** – É o milho colhido em estágio ainda imaturo (verde). As espigas são verde-claras e os grãos amarelados. Produz em vários tipos de solo, porém é exigente em adubação com zinco e magnésio, devendo ser bem adubado. Essa cultura é uma ótima opção para rotação de culturas com as demais hortaliças. Existem cultivares para colheita de milho-doce e para colheita de milho-verde. O milho-doce possui grãos ricos em açúcar, enquanto os grãos de milho-verde são ricos em amido.

**Nome popular:** Milho doce

**Nome científico:** Zea mays

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MILHO DOCE	AGO./FEV.	SET./DEZ.	OUT./MAR.	SET./JAN.	MAR./MAIO	80/110 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

MELÃO	<i>Cucumis melo</i>
-------	---------------------

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Cucumis melo*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## MELÃO



**Época e regiões para plantio** – É uma planta de clima quente e todas as fases de desenvolvimento da planta são prejudicadas por baixas temperaturas (temperatura mínima ideal é em torno de 20°C). Não tolera frio nem geadas. Dias e noites quentes e baixa umidade relativa do ar são as condições ideais para essa cultura.

**Descrição** – A planta é muito parecida com a da melancia. As cultivares de melão estão distribuídas em dois grupos: inodorus (de casca firme e polpa usualmente branca), e aromáticos (de casca mais frágil e com aroma e sabor mais fortes). É uma cultura exigente em adubação. Pode ser plantada por mudas feitas em bandejas ou copinhos. É necessário girar os frutos, expondo toda a superfície à luz do sol para obter uma cor mais uniforme.

**Nome popular:** Melão

**Nome científico:** *Cucumis melo* L.

### ESPÉCIE

### ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO

### INÍCIO DA COLHEITA

	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
MELÃO	*	SET./FEV.	MAR./SET.	SET./DEZ.	ABR./AGO.	80/120 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

PEPINO CAPIRA

*Cucumis sativus*

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Cucumis sativus*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



### PEPINO CAIPIRA



**Época e regiões para plantio** – É uma cultura de clima quente, e se adapta a temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Frio e geada prejudicam e podem até destruir a cultura. No inverno não muito rigoroso pode ser cultivada em casas de vegetação (estufa), podendo se beneficiar dos melhores preços no mercado.

**Descrição** – É uma planta da mesma família da abóbora e do chuchu. Pode ser trepadeira se tiver suporte. Em geral, necessita de abelhas para polinizar e formar os frutos. Há cultivares, entretanto, que produzem frutos sem a necessidade de polinização. Atualmente são encontrados cinco tipos de pepino do mercado: grupo Caipira, grupo Aodai, grupo Japonês, grupo Holandês (Beith-alpha) e grupo Agroindustrial (usado na fabricação de pickles). Adapta-se melhor em solos arenosos e ricos em adubação orgânica. Pode ser plantado via semente em local definitivo ou por mudas, semeadas em bandejas. Deve-se ralear os frutinhos mal formados logo que o problema ocorrer.

**Nome popular:** Pepino caipira

**Nome científico:** *Cucumis sativus*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
PEPINO CAIPIRA	SET./FEV.	SET./FEV.	ANO TODO	JUL./NOV.	ABR./SET.	45/60 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

QUIABO	<i>Abelmoschus esculentus</i>
--------	-------------------------------

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Abelmoschus esculentus*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



*Abelmoschus  
esculentus*

**Época e regiões para plantio** – Exige temperaturas altas e não tolera frio

**QUIABO**



**Descrição** – É um arbusto originário da África, rústico e tolerante à acidez elevada do solo. Seus frutos são ricos em Vitamina A, B1, C. Na véspera do plantio, a dormência das sementes deve ser quebrada imergindo-as em água por 24 horas. O plantio pode ser por semeadura direta ou por mudas. É pouco exigente em água. Frio intenso pode provocar queda de flores e frutos.

**Nome popular:** Quiabo

**Nome científico:** *Abelmoschus esculentus*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
QUIABO	OUT./DEZ.	AGO./MAR.	ANO TODO	AGO./FEV.	ANO TODO	70/80 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

REPOLHO LOUCO DE VERÃO

*Brassica oleracea*

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# Brassica oleracea

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



### REPOLHO LOUCO DE VERÃO



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se bem sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) e frias, resistindo bem a geadas. Entretanto, há cultivares adaptadas a temperaturas mais altas.

**Descrição** – O repolho possui folhas arredondadas dispostas umas sobre as outras, em forma de cabeça. É rico em fibras, sais minerais e vitaminas do complexo B, E e K. Temperaturas altas fazem com que as cabeças não fiquem bem formadas. O plantio é feito por mudas, semeadas em bandejas. É exigente em adubação e água, que deve ser fornecida constantemente para evitar rachaduras.

**Nome popular:** Repolho louco de verão

**Nome científico:** *Brassica oleracea L.*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
REPOLHO LOUCO DE VERÃO	NOV./JAN.	OUT./FEV.	ANO TODO	OUT./FEV.	MAR./SET.	90/110 DIAS

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Erioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

RÚCULA

*Eruca vesicaria ssp. sativa*

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Eruca vesicaria ssp. sativa*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## *Eruca vesicaria ssp. sativa*

**Época e regiões para plantio** – Produz melhor sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Nas regiões em que o verão é ameno, pode ser plantada durante o ano todo.

### RÚCULA



**Descrição** – A rúcula apresenta plantas de porte baixo, suas folhas são alongadas e recortadas, de coloração verde escuro e de sabor picante. Dentre todas as hortaliças, a rúcula é a fonte mais rica em ferro. Contém ainda cálcio, fósforo, Vitaminas A e C. Propaga-se por sementes plantadas em local definitivo ou em bandejas, sendo transplantadas posteriormente. A colheita se inicia de 40 a 60 dias após a semeadura, podendo-se colher os rebrotamentos.

**Nome popular:** Rúcula ou pinchão

**Nome científico:** *Eruca vesicaria ssp. sativa*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
RÚCULA	MAR./AGO.	MAR./AGO.	MAR./JUL.	MAR./JUL.	*	40/60 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

### VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

SALSA	<i>Petroselinum crispum</i>
-------	-----------------------------

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Petroselinum crispum*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

## *Petroselinum crispum*

**Época e regiões para plantio** – É uma planta de clima subtropical. Prefere temperaturas amenas, não muito frias, nem muito quentes (em torno de 20°C).

### SALSA



**Descrição** – É um condimento aromático cujas folhas são ricas em vitamina A. Há cultivares de folhas lisas, crespas e muito crespas. Há ainda variedades para consumo das raízes. A germinação de suas sementes é muito lenta, principalmente se a temperatura for baixa. Para acelerar a germinação, recomenda-se deixar as sementes de molho em água durante uma noite. Prefere solos bem drenados, ricos em matéria orgânica, que devem ser mantidos sempre úmidos.

**Nome popular:** Salsa, Salsinha

**Nome científico:** *Petroselinum crispum*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
SALSA	MAR./SET.	MAR./SET.	MAR./AGO.	MAR./AGO.	*	60/70 DIAS

TELEFONE: (41) 3666-8426

WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulos

CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

VARIETADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE	
TOMATE CEREJÃO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE CEREJA COMPRIDO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE CEREJA	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE CEREJA MIUDO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE CEREJA MISTURADO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE CEREJA CHATO GRANDE	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE AMARELO GRAUDO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE BIQUINHO VERMELHO	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE PIMENTA	<i>Solanum lycopersicum</i>
TOMATE TIPO SALADA	<i>Solanum lycopersicum</i>

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

# *Solanum lycopersicum*

TELEFONE: (41) 3666-8426

[WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG](http://WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG)



*Solanum  
lycopersicum*

**TOMATE TIPO SALADA**



**Época e regiões para plantio** – Desenvolve-se melhor em regiões altas (serras e planaltos) de clima tropical e também em clima subtropical ou temperado, seco e com alta incidência de luz solar. Regiões muito úmidas e quentes são problemáticas para a cultura, favorecendo doenças.

**Descrição** – É uma das hortaliças mais consumidas no mundo, sendo fonte de vitaminas A e C e de sais minerais como potássio. Há cultivares de crescimento determinado (destinadas para indústria de processamento) e de crescimento indeterminado (maioria destinada para mesa). São reunidas em cinco grupos: grupo Santa Cruz, Salada, Cereja, Italiano (ou Saladete ou San Marzano) e grupo Agroindustrial. É bastante exigente em adubação e é muito atacada por doenças, exigindo elevado conhecimento da cultura para um cultivo eficiente.

**Nome popular:** Tomate tipo salada

**Nome científico:** *Solanum lycopersicum*

ESPÉCIE	ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO					INÍCIO DA COLHEITA
	Sul	Sudeste	Nordeste	Centro-Oeste	Norte	
TOMATE TIPO SALADA	SET./FEV.	ANO TODO	ANO TODO	ANO TODO	MAR./JUL.	100/120 DIAS



# CRÉDITOS

AOPA, Janeiro de 2022

## REALIZAÇÃO

**AOPA** - Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia

## COORDENAÇÃO

**Diretora Presidente (AOPA):** Daniele Comarella

**Diretor Geral (AOPA):** Nei Zuzek

## EDITORAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Vinicius Correia

## REVISÃO

Daniele Comarella

Fernanda Striker Fernandes Baggio

Manuela de Faria

## IMAGENS

Vinicius Correia

## COLABORADORES

Gabriele Pilatti

Fernanda Striker Fernandes Baggio

Ediel Paitch



**SEMENTES DE FEIJÕES CRIoulos**  
DA CASA DA SEMENTE DE MANDIRITUBA - PR  
FOTO: VINICIUS CORREIA

## CARTILHA DE SEMENTES 2022

# Sementes Crioulas



CASA DA SEMENTE, MANDIRITUBA - PR

(41) 3666-8426  
AOPAAGROECOLOGIA@GMAIL.COM  
WWW.AOPAAGROECOLOGIA.ORG

### REALIZAÇÃO



### PRODUÇÃO



### PATROCÍNIO



MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO

